

COVID-19

QUOI FAIRE SI MON ENFANT ÂGÉ DE 6 À 17 ANS A DES SYMPTÔMES?

La liste des symptômes et les consignes à suivre en cas de symptômes s'appliquent **peu importe le statut vaccinal**.

MON ENFANT A **UN DES SYMPTÔMES SUIVANTS** :

- Fièvre $\geq 38,1$ °C
- Toux récente ou aggravation d'une toux chronique
- Perte d'odorat soudaine (sans congestion nasale) avec ou sans perte du goût
- Essoufflement
- Difficulté à respirer
- Mal de gorge
- Mal de tête
- Fatigue intense
- Douleurs musculaires (non liées à un effort physique)
- Perte d'appétit importante
- Maux de ventre
- Nausées
- Vomissements
- Diarrhée



Si les symptômes débutent à la maison

J'avise l'école et je garde mon enfant à la maison.



Si les symptômes débutent à l'école

L'école communique avec moi afin que j'aille chercher mon enfant pour un **retour à la maison immédiat**.



Je remplis l'**outil d'autoévaluation en ligne en cliquant ici**. Je suis les consignes données ou j'appelle le **1 877 644-4545**.



Si mon enfant doit passer un test de dépistage, **les membres de la maisonnée n'ont pas à s'isoler en attendant le résultat du test**.



S'il reçoit un résultat de test négatif*, que ses symptômes ont diminué et qu'il présente un bon état général, mon enfant peut **reprendre ses activités****.

*Si indiqué lors de l'autoévaluation en ligne.

**Sauf s'il est en isolement parce qu'il a été en contact avec une personne positive à la COVID-19.



S'il reçoit un résultat de test positif, il doit **s'isoler pendant 10 jours**. **Les membres de la maisonnée** doivent suivre les consignes données par la Direction de santé publique de l'Estrie au moment de l'enquête.



JE REFUSE LE DÉPISTAGE?

Si mon enfant doit être dépisté pour la COVID-19, mais que **je ne veux pas le faire tester**, je dois le garder en **isolement à la maison pendant une période minimale de 10 jours** à partir du début de ses symptômes **ET jusqu'à leur disparition**.



Dans cette situation, **les membres de la maisonnée doivent aussi s'isoler pendant 10 jours** et doivent effectuer une autosurveillance de leurs symptômes pendant 14 jours.